

208-430 20.....év 25 hó 14 nap
Kittétel: 20.....év 25 hó 14 nap
Levéltel: 20.....év 25 hó 31 nap



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban növény-egészségügyi hatóság) Zala vármegye felsorolt települései zártkertjén szőlő ültetvényeiben a 2013 - 2024. évek növény-egészségügyi felderítései során szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító okozta fertőzést állapított meg, mely következtében a felsorolt településekre vonatkozóan

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI ZÁRLAT - o t

rendelt el az alábbiak szerint:

- A zárlati károsítóval fertőzött, illetve a fertőzés tüneteit mutató szőlő növények termő helyeit fertőzött ültetvényekké nyilvánította.
- A fertőzött ültetvények 4 km-es körzetében lévő települések érintett bel- és külterületi (zártkeri) - ingatlanokon található szőlő ültetvényeket és szőlő növényeket fertőzött- és feltételeken fertőzött körzetként (körülhatárolt területként) jelölte ki.
- minden szőlő növény és ültetvény tulajdonosára, valamint használatjára

Minden szőlő növény és ültetvény tulajdonosa, valamint használatja az alábbi előírásokat köteles betartani:

- 1.) A növény-egészségügyi hatóság által megjelölt fertőzött és fertőzési tüneteket mutató növényeket gyökerestől ki kell vágni és meg kell semmisíteni.
- 2.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről hatósági engedély nélkül szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre bevinni tilos!
- 3.) A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) rovar szőlővesszőkre

esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított vesszőket égetéssel, vagy felaprítva talajba dolgozva kell megsemmisíteni, valamint tavasszal a rügyfakadás közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát.

4.) Az amerikai szőlőkabóca, mint a zárlati károsítót terjesztő rovarvektor ellen kötelező a védekezés a következők szerint. A zárlat fenntartásáig a rovar biológiájához időzített, a vegetációs időszakban (várhatóan június közepétől kezdődően) minimum 2-3 alkalommal kötelező a rovarölő szerek védekezés. A célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást (permetezési naplót) szükséges vezetni, melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni! A felhasználható rovarölő szerek listája a védekezési felhívás mellékletében található meg.

5.) A fertőzött táblán vagy annak környékén előforduló további szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell a növény-egészségügyi hatóságnak. A Zala Megyei KH AF Növény- és Talajvédelmi Osztály részére.

(Tel: 06/92/550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu)

A növény-egészségügyi hatóság figyelmezteti a termelőket, hogy amennyiben az előírt kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget, a hatóság az ügyfelekkel szemben 500.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedő mértékű növényvédelmi bírságot szab ki.

A hatóság felhívja a termelők figyelmét arra, hogy a határozatban foglaltak be nem tartásával adott esetben megvalósíthatják a 2012. évi C. törvény (Btk.) 361. § c) pontjában meghatározott, elzárással is büntethető járványügyi szabályszegés vétségét.

A fertőzött területen belüli található elhanyagolt ültetvények és egyéb gondozatlan szőlő területeket tulajdonosai/használoival szemben hatósági eljárás indítható.

További információval szívesen állunk rendelkezésükre elérhetőségeinken:

Telefon: 92/550-160; E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kintizi u. 81.

Telefon: (36 92) 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Zárlati intézkedéssel érintett települések:

Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk,
Bak, Babosdöbréte, Bagod, Baktúttós, Balatongyörök, Barlahida,
Becsehely, Becsvölgye, Belezna, Bezeréd, Bocföldre, Bocska,
Boncodföldre, Bókaháza, Borsfa, Böde, Börzönce,
Bucsuszentlászló, Bucsuta, Csapi, Csátár, Cserszegtomaj,
Csertalajos, Csonkahegyhát, Csöde, Csörnyeföld,
Csömödér, Dióskál, Dobri, Dobronhegy, Dötk,
Egeraracsa, Egervár, Eszteregnye, Esztergályhorváti,
Felsőpáhok, Felsőrajk, Fityeháza, Fűzvölgy, Galambok,
Garabonc, Gellénháza, Gelse, Gelsesziget, Gétye,
Gomboszeg, Gosztola, Gősfá, Gutorföldre,
Gyenesdiás, Gyülevész, Gyűrűs, Hahót, Hernyék, Hévíz,
Homokkomárom, Hosszúvölgy, Hottó, Iborfia,
Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Keszthely, Kilimán,
Kisbucsa, Kiscsehi, Kisgörbő, Kiskutas, Kispáli,
Kisrécse, Kissziget, Kistolmács, Lakhegy, Lendvadedes,
Lenti, Letenye, Lickóvadamos, Lovászi,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld,
Mihályfa, Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Misefa, Molnári,
Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagykapornak,
Nagylengyel, Nagypáli, Nagyrada, Nagyrécse, Nagyutas,
Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza,
Nemesszentandrás, Németfalu, Németfalu, Nova,
Óhid, Oltárc, Orbánosfa, Ormándlak, Orosztony,
Padár, Pacsa, Páka, Pakod, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Petrivente, Pókaszeptek, Pölöske, Pölöskefő,
Rédics, Rigyác, Salomvár, Sand, Sárhida, Sármellék,
Semjénháza, Sénye, Sormás, Söjtör, Surd, Szalapa,
Szentgyörgyvár, Szentkozmadombja, Szentlászló,
Szentmargittfalva, Szentpéterföldre, Szentpéterúr, Szepetnek,

Szécsisziget, Szilvág, Tekenye, Teskánd, Tilaj, Tilajújhegy,
Tófej, Tormaföldre, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton,
Tótszerdahely, Túrje, Újudvar, Valkonya, Vasboldogasszony,
Vállus, Várköly, Vindornyafo, Vindornyaszőlős,
Vonyarcvashegy, Vöckönd,
Zajk, Zalaapáti, Zalaboldogfa, Zalacsány, Zalacséb,
Zalaegerszeg, Zalaigrice, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalaölő,
Zalakaros, Zalakoppány, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalasabar, Zalaszentbalázs,
Zalaszentgrót-Aranyod, -Csáford, -Zalaudvarnok,
Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentjakab,
Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmárton,
Zalaszentmihály, Zalatárnok, Zalaudvarnok, Zalaújlak, Zebecke,

Szőlőkabóca elleni védekezésre engedélyezett készítmények bor- és csemege szőlőben – 2025. év

Hatóanyag	Készítmény neve	Adagolás	Méh- veszélyesség	Forgalmi kategória	Kezelések évenkénti száma max.	Élelmezés- egészségügyi várakozási idő (nap)	Megjegyzés
tau-fluvalinát	Klartan 24 EW, Mavrik 24 EW,	0,2-0,3 l/ha	nem jelölésköteles	II.*	2	21	Virágzáskor használható tebukonazol hatóanyagtartalmú készítménnyel (Folicur, Tebusha, stb.) keverve méhkímélő technológia
flupiradifuron	Sivanto Prime – Sanium System -	0,4 l/ha, 0,5 l/ha 0,4 %	nem jelölésköteles	II. II/III.***	1	14	Virágzáskor használható
acetamiprid	Mospilan 20 SG, Spilan 20 SG, Gazelle 20SG	0,25-0,375 kg/ha	nem jelölésköteles	I/II./III. ****	1	7	Virágzáskor használható tebukonazol hatóanyagtartalmú készítménnyel (Folicur, Tebusha, stb.) keverve méhkímélő technológia

[illegible]

nébih



Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma
Grapevine flavescence dorée

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

SZŐLŐ ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG FITOPLAZMA

'Candidatus Phytoplasma vitis', Grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma




Az arany színű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb karantén kórokozója, amely bejelentési kötelezettség alá tartozik. A kórokozó Európa számos országában már jelen van szőlőn. Hazánkban 2013 augusztusában először a Zala vármegyei Lenti város határában észlelték, de azóta számos vármegyében igazolták jelenlétét veszélyeztetve ezzel történelmi borvidégeinket.

Jelenleg 19 vármegyéből 12-ben már igazoltan jelen van a kórokozó, 22 borvidékből 14 érintett. A helyzet továbbra is Zala vármegyében a leg-súlyosabb, ahol a vármegye egész területe fertőzött, valamint a Balaton északi és déli részén, azaz Veszprém és Somogy vármegye egyes területein is komoly a fertőzöttség. A többi területen a kórokozó előfordulása szóróványos.

2019 előtt a fertőzés csak a dunántúli vármegyéket érintette, 2019-ben pedig a Duna-Tisza közére is áttért, ahol Bács-Kiskun, majd Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéket is érintette a fertőzés. Az ország északi részén levő történelmi borvidékek továbbra is mentesek a kórokozótól.

**ÉRTESÍTSE HATÓSÁGUNKAT,
HA GYANÚJA VAN A SZŐLŐ
ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG
BETEGSÉG JELENLÉTÉRE!**

+36 1 336 9000



Milyen növényeket fertőz? - Csak a szőlőn okoz gazdasági kárt!

Az európai szőlő szinte mindegyik fajtája fogékony a betegségre, különösen a Chardonnay, valamint a Cabernet sauvignon, a Sauvignon blanc, a Pinot noir és az Olaszrizling. Egyéb szőlő (*Vitis* spp.) fajok is gazdanövényei, az amerikai

alanyfajtákat többnyire tünetmentesen fertőzi. Az erdei iszalag, az éger és a bálványfa, valamint a mogoró és a fűzfafélék is gazdanövényei, melyekből a terjesztő rovarral átkerülhet a korokozó a szőlőre.


FŰZFAFÉLÉK




MOGYORÓFÉLÉK




ISZALAG



BÁLVÁNYFA



ÉGER



Miért jelent veszélyt?

- a fertőzés következtében a szőlőtőkék **terméshozama 20-50 %-kal csökkenhet**
- a **tőkék 80-100 %-a is megfertőződhet** a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is **pusztulhatnak**
- a **betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szerek eljárás**

Hogyan ismerjük fel, milyen tünetek utalnak a jelenlétére?

Az FD fitoplazma tünetei megegyeznek a szintén sárgaság betegséget okozó, Magyarországon gyakran előforduló sztolbur fitoplazma kórokozóival. A két kórokozót kizárólag laboratóriumi módszerekkel lehet elkülöníteni.

A környezeti hatások (aszály) és a tápanyaghiány okozta elváltozásokkal azonban a sárgaság betegség tünetei nem keverhetők össze.

Az aranyszínű sárgaság terjedése járványszerű, az újabb növények fertőződése egy-egy beteg tőke körül foltszerűen következik be és látványos pusztulást okoz.

A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha hajtások sem képződnek. A fogékony fajtáknál a fásodás elmarad, a vessző elvékonyodik és gumiszerűvé válik. Ha a tőke a tenyészidő során később fertőződik, a megindult fásodás megáll. A hajtásokon az első, enyhe sodródást mutató levelek a nyár közepén jelennek meg. A tünetek fokozatosan erősödnek, és kialakul a betegségre jellemző, levél fonáka felé történő, háromszög alakú sodródás.


LEVÉL SÁRGULÁSA



ÍZKÖZÖK RÖVIDÜLÉSE



EGYENETLEN FÁSODÁS



ERŐS FERTŐZÉS FEHÉR BOGYÓJÚ FAJTÁN




LEVÉL VÖRÖSÖDÉSE KÉK BOGYÓJÚ FAJTÁN




A napnak kitett levélrészeken a fehér bogyójú fajtáknál a levéllemez részleges vagy teljes sárgulása, kék bogyójú fajtáknál vörösödése figyelhető meg. Mindkét esetben a levélfelület fémes színezetet kaphat. Augusztus és szeptember hónapokban a főerek mentén krémsárga foltok jelennek meg, amelyek fokozatosan terjednek a levélfelületen, végül a teljes levél

elszárad. Az így elhalt, megkeményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek. Télen a be nem érett vesszők elfeketednek és elpusztulnak. A következő tavasszal a megmaradt rügyekből keletkező virágzat leszárad, kevesebb fürt képződik. Késői fertőzés esetén a bogyók zsugorodnak, megbarnulnak, rossz ízűvé válnak.

MEGBARNULT BOGYÓK



ZSUGORODÓ BOGYÓK



Hogyan terjed a betegség és mit tehetek ellene?


A korokozó a fertőzött növény hancsrészában él, önállóan és mechanikai úton továbbterjedésre nem képes, de például vektorral, fertőzött szaporítóanyaggal igen.

SZAPORÍTÓANYAGGAL




Fontos az egészséges és ellenőrzött szaporítóanyag, mert nagy távolságokra elsősorban fertőzött szaporítóanyaggal kerülhet. Ültessen hatóságilag ellenőrzött, növényútlevéllal kombinált hatású címkével ellátott szaporítóanyagot!

FERTŐZÉSI FORRÁSKÉNT SZOLGÁLÓ VADON ÉLŐ GAZDANÖVÉNYEK JELENLÉTÉVEL



Tisztítsa meg az erdei iszalagtól ültetvényét és számolja fel a növényegészségügyi szempontból kockázatos elhanyagolt ültetvényét!

FIATAL LÁRVA



IDŐSEBB LÁRVA



KIFEJLETT KABÓCA



LEVEDLETT LÁRVABŐR



TERJESZTŐ ROVARRAL (amerikai szőlőkabóca)



Az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) testében felszaporodó kórokozó a rovar szívogató táplálkozása során kerül át a fertőzött növényekről a közeli szőlő ültetvények egészséges növényeibe a fitoplazma.

Fontos a károsítót terjesztő kabócák elleni rendszeres rovarölő szeres kezelés.


Viszonylag könnyen lehet védekezni a lárvák ellen, amelyek kelése időjárástól függően május közepétől július elejéig tarthat. Az ültetvényben a kabóca első észlelését követően célszerű az első kezelést június elején-közepén kontakt rovarölő szerrel elvégezni, majd 10-15 nap múlva megismételni.


Védekezzen a kabócák ellen!

- **SEMMISÍTSE MEG A TÉL VÉGI NYESEDÉKET,** hiszen a kabóca tojás alakban telel át a szőlővessző kérge alatt, így fenn tud maradni a tél végi metszéssel eltávolított vesszőkön is.
- **HELYEZZEN KI SÁRGA RAGACSLAPOKAT**
A károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca nyomon követése érdekében sárga ragacsos színcsapdák kihelyezésével végezhető felderítés a szőlőültetvényekben. Olyan területeken, ahol az amerikai szőlőkabóca előfordul, rendszeres kémiai védekezés szükséges.
- **PERMETEZZEN** – tojások ellen olajtartalmú szerekkel a nyugalmi időszakban – lárvák és a kifejlett egyedek ellen a tenyészidőszakban.



AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA ÉLETCIKLUSA ÉS AZ ELLENE JAVASOLT VÉDEKEZÉSEK IDŐZÍTÉSE





Kihez fordulhatunk?

Kérjük, azonnal értesítse hatóságunkat és az illetékes vármegyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Osztályát, ha a fenti információk alapján gyanúja van a károsító jelenlétére.

Hazánkban a (kabóca, szőlő levél, iszalag stb) minták vizsgálatát a Nébih ÉLI Növény-egészségügyi Nemzeti Referencia Laboratóriuma végzi. Amennyiben laboratóriumi vizsgálatok alapján beigazolódik a fitoplazma-fertőzés, a hatóság haladéktalanul zárlat alá helyezi az érintett szőlőültetvényt, faiskolát, és elrendeli az összes fertőzött, illetve tünetes növény megsemmisítését.

Mit tesz a hatóság a bekövetkezett fertőzések felszámolása érdekében?

A hatóság a fitoplazmával fertőzöttnek kimutatott tőkék körüli 1 km sugarú területen a tünetes tőkék megsemmisítését rendeli el, illetve megtiltja a szőlő szaporítóanyag forgalmazását és szállítását, valamint új szaporítóanyag-termő terület létesítését. 4 km sugarú területen pedig fokozott felderítést és kötelező védekezési programot ír elő.



JÁRJUNK NYITOTT SZEMMEL!

A FITOPLAZMA TERJEDÉSÉNEK KOCKÁZATA IGEN JELENTŐS, A TERJESZTŐ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA PEDIG JELEN VAN A HAZAI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN.

További információk:

Kinek mi a szerepe az országos védelmi programban? (a Nemzeti Készenléti Terv tartalmazza)
portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatok-kiadvanyok

Bejelentés kötelezett károsítók:
portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/bejelenetes-kotelezett-karositok

Mikor és mivel végezzem a kezeléseket?
<https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso>

Hol kaphatok tájékoztatást?
portal.nebih.gov.hu/novenyegeszsegugy

nébih

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu • ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
+36/1 336 9000