

HIVATALOS VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS
2026/II.**A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN TERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!****1. INDOKLÁS**

Az amerikai szőlőkabóca imágók megjelenése 2026. 07. 14. napján megkezdődött. A kártevő terjeszti a szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó (FD) fitoplazmát, mely betegség gyógyíthatatlan. A védekezés célja a járvány megfékezése.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el:
<https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A mulasztás növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

Stádium	Optimális időpont	Művelet
Kifejlett alak (imágó)	2026. augusztus 07-17. között, További kezelések előrejelzési adatok, sárga ragacslapos megfigyelés szerint a szüreti és azt megelőző élelmezés-egészségügyi várakozási időszak kivételével. NÉBIH szükséghelyzeti engedély kiadása esetén szeptember végéig	Permetezés

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes rovarölő szer lista mellékelve, illetve a NÉBIH honlapján vagy az alábbi linken:
<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Permetlé fedettsége: Ügyeljen a teljes lombfelület és a levelek fonákának megfelelő permetborítására.
- Szerfelhasználás: Javasolt legalább **több alkalommal felszívódó készítményt alkalmazni** a tartós hatás érdekében. **Fontos a terület egységre szükséges rovarölő szer kijuttatása!**
- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KONVENCIONÁLIS

Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása

ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS

Az arany színű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

6. HATÓSÁGI SZEMÉLYEK ÉS HEGYBÍRÓK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal a növényvédelmi hatósághoz (Tel.: 92/ 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) és a hegybíróhoz (83/362-089).

2026. augusztus 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

AF Növény- és Talajvédelmi Osztály

208-435	/20.26. lkt. szám
Kitétel: 20.26. év	08. hó 06. nap
Levétel: 20.26. év	11. hó 04. nap

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2026. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a Zala vármegye összes szőlő területén elvégzendő 3. kötelező védekezésre:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2026. évben is folyamatosan vizsgálja a szőlő területen az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) egyedfejlődését és egyedszámának alakulását. A 2026. július 09-én elvégzett felmérés szerint egyes szőlőültetvényekben még megtalálhatóak voltak a kabóca utolsó (L₅) lárvastádiumú egyedei, ami azt jelenti, hogy feltehetőleg augusztus első napjaiban az összes egyed már teljesen kifejlődik repülésre is képes imágóvá. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évek hasonló időszakához képest a kihelyezett sárgalapok kevesebb kifejlett alakot fogtak. A felhagyott, illetve hagyományos ültetvényben még a védekezési küszöb környéki a kabóca egyedszáma, az ökológiai ültetvényben már jóval az védekezési küszöb feletti. Ezt támasztják alá a csapdázási pontokon elvégzett hálózások eredményei is, mely szerint egyes ökológiai művelésben részesített szőlőültetvényekben növényenként legalább 1-2 kifejlett kabóca volt megtalálható.

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért a harmadik kötelező védekezést augusztus első felében, de legkésőbb augusztus 17. napjáig szükséges elvégezni valamennyi szőlőtermő területen a szüret időpontja és az ételmezés-egészségügyi várakozási idő betartásának lehetősége szerint.

Az ökológiai ültetvényekben a nagyobb egyedszám miatt a védekezést már a megadott periódus elején ajánlott végrehajtani.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagában nem elegendő, a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése válhat indokolttá. Ezért elengedhetetlen a kártevő népességének a megfigyelése. A szaporítóanyag előállító területeken legalább 3 színcsapdát kell kihelyezni hektáronként. Termő ültetvényekben az ajánlott sűrűség 5 ha-os táblaméretig 3 csapda/ha, 5–10 ha összefüggő táblaméretig 2 csapda/ha, és 10 ha feletti összefüggő táblaméret esetén 30 csapda/ültetvény. Hetente két alkalommal szükséges a csapdafogást leolvasni, illetve a lombozaton az imágók jelenlétét megfigyelni. A fogások alapján kicsi a kifejlett alakok populációsűrűsége, ha a fogott egyedek száma átlagosan 4 egyed/csapda/10 nap, közepes, amennyiben 4–15 egyed/csapda/10 nap a fogás és magas, ha a csapdázott imágók száma nagyobb, mint 15 egyed/csapda/10 nap. A védekezési küszöbérték 4 egyed/sárga lap/10 nap.

Fontos, hogy a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca repülésre képes imágója át tudja vinni a fertőzött tőkéről egészséges tőkére a kórokozót táblán belül és táblák között is.

Szaporítóanyag-előállító területek – ideértve a törzsültetvényeket és faiskolákat – a védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy az adott területen észleltek-e kabócát.

Alkalmazható készítmények és technológiák

A védekezésre a felhívás 1. sz. mellékletének (Nébih honlapján elérhető Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek) táblázatában szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

A konvencionális szőlőültetvények esetében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által elkészített védekezési technológia elérhető az Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása linken.

Az ökológiai szőlőültetvények esetében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által elkészített védekezési technológia elérhető Az aranyszínű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet linken.

Lényeges, hogy a kezelések során olyan növényvédő szereket használjon a szőlőtermelő, amelyek a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezettek, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia (lásd 1. sz. melléklet) pedig nem zárja ki a kifejezett alak elleni alkalmazásukat.

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratain alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adatlappal lehetséges.

Rezisztenciakezelés és technológiai tervezés

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a termelők figyelmét arra, hogy az integrált növényvédelem alapelveinek betartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rezisztencia kialakulásának megelőzésére. Ennek érdekében:

- a készítmények engedélyokiratában meghatározott maximális kezelésszámot be kell tartani,
- a hatóanyagok kiválasztását (rotációját) és alkalmazását tudatosan kell megtervezni,
- valamint a későbbi kezelésekhez olyan készítményeket kell tartalékolni, amelyek az adott fenológiai állapotban még kijuttathatók és élelmezés-egészségügyi várakozási idejük is betartható.

AKG és ÖKO támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettség

A szőlő aranyszínű sárgaság terjedésének megakadályozása érdekében:

- a KAP-RD19a-1-24 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések” (AKG),
- valamint a KAP-RD20a-1-24 kódszámú „Ökológiai gazdálkodás támogatása” (ÖKO)

pályázati felhívások keretében támogatott szőlőültetvényekben évente legalább két alkalommal kötelező növényvédőszeres védekezést végezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben vármegyénk néhány szőlő ültetvényében már 2026. 06. 10. napján, tömegesen július közepe táján jelentek meg. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a bogyók töppedése is megindult. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés másik pillére ebben az időszakban a szőlő növények folyamatos szemlézése, illetve a tüneteket mutató, a fertőzés forrását és a betegség fennmaradását biztosító tőkék leveles hajtásrendszerének eltávolítása a növényvédő szeres kezelés elvégzését követően. Fontos, hogy ez után a tőke gyökerestől történő kivágása megtörténjen, akár a vegetáció végét követően is, illetve, a kivágott

tőke helyét megjelölik. A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, még a leveles hajtások eltávolítása, a tőke kivágása előtt.

A hatékony védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztesse a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

A növényvédőszeres védekezéshez felhasználható készítmények listáját a felhívás *1. sz. melléklete* (Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek) tartalmazza.

Zalaegerszeg, 2026. augusztus 04.

dr. Cseresnyés Béla főispán
nevében és megbízásából:

Szabó Béla
osztályvezető

Kapják:

1. Zala vármegyei települések önkormányzatai kihirdetésre (elektronikusan)
2. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala vármegyei Szervezete (elektronikusan)
3. Zalaszentgróti Hegyközség (elektronikusan)
4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
5. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek
(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

1. sz. melléklet

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Kiszerezés	A legkisebb kiszerezéssel lekezelhető terület	A kezelések max. száma / év	Élelmezés ü. várakozási idő (nap)	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m ² 3333 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Forte Detector, Nuyard	deltametrin	I. II.	≥100 ml 50 ml	1,3 ha 6.666 m ²	2	(bor) 30 (csem) 7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Mega	deltametrin	II.	≥100 ml	666 m ²	3	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Karate Zeon 5 CS Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS, Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS	lambda- cihalotrin	II. III.	≥200 ml 2,5; 5; 50 ml	8000 m ² 2,5 ml-100 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Klartan 24 EW Mavrik 24 EW Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	0,2 l 3 ml	6.666 m ² 100 m ²	2	21	lárva, imágó	kontakt	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra	lambda- cihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1 kg; 5 kg	100 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Mospilan 20 SG Gazelle 20 SG, Mospilan 20 SG Original, Rafting, Spilan 20 SG; Mospilan SG *	acetamiprid	I. II. III.	≥1 kg 100 g 4 g	2,6 ha 2.666 m ² 106 m ²	1 <i>csak szőlő alanytelepen használható</i>	nk	lárva	szisztémikus	<i>csak szőlő alanytelepen használható</i>
Carnadine Roslix, Silentium; Carnadine, Carnadine 200, Roslix	acetamiprid	I. II.	≥150 ml ≥2 ml	8.571 m ² 114 m ²	1 2026.04.21.- 2026.08.18.	(7)	lárva	szisztémikus	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Exirel, Irazu	ciántraniliprol	I. II.	≥200 ml ≥20 ml	2.222 m ² 220 m ²	2	(10)	lárva	szisztémikus	veszélyes virágzásban nem

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláson lévő / csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Sanium System Deltam System	flupiradifuron	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,4 % (10 l vízhez 40 ml)	1	14	lárva, imágó	szisztemikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Prime Sivanto Prime 200 S	flupiradifuron	I. II.	200 l 50 ml	400- 500 ha 1000-1250 m ²	1	14	lárva, imágó	szisztemikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Energy Sivanto Energy 85 E	deltametrin+ flupiradifuron	I.	≥250 ml	6.250 m ²	2	14	lárva, imágó	kontakt és szisztemikus	veszélyes virágzásban nem
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	≥0,25 l	8.333 m ²	2	14	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Sumi Alfa 5 EW Sumicidin 5 EW	eszfenvalerát	I.	≥5 ml	166 m ²	2	21	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Pyregard ökológiai termesztésben is felhasználható	piretrin	I.	1 l	1,3 ha	2 2026.03.16.- 2026.07.13.	7	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem
Laser, Nexsuba ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II.	≥500 ml	1,25 ha	2	(15)	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Laser Duplo ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II. III.	≥250 ml 2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	1,25 ha 2 ml-100 m ²	2	(14)	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Limocide ökológiai termesztésben is felhasználható	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	1	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem
Aza ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II.	≥150 ml	500 m ²	2 2026.05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
NeemAzal-T/S ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II. III.	≥2,5 l 25; 50; 100 ml; 1 l	8.333 m ² 25 ml-83 m ²	2 2026. 05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláson lévő / csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.